

DOLOPLUS SCHAAL-2

GEDRAGSMATIGE PIJNBEOORDELING BIJ OUDEREN

NAAM :

Voornaam :

DATUM

Afdeling :

| LICHAMELIJKE REACTIES | | | | | |
|--|---|-------|---|---|---|
| 1 Lichamelijke klachten | • Geen klachten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • Klachten alleen bij navraag | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | • Spontane klachten die af en toe voorkomen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | • Spontane klachten die voortdurend aanhouden | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 Pijnvermijdelich aamshouding in rust | • Geen pijnvermijdelich aamshouding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • Patiënt vermijdt af en toe bepaalde lichaams houdingen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | • Permanente doeltreffende pijnvermijdelich aamshouding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | • Permanente niet doeltreffende pijnvermijdelich aamshouding | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 Afscherming van pijnlijke plaatsen | • Geen afscherming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • Afscherming bij toenadering, zonder dat voortzetting van het onderzoek of verzorging wordt belemmerd | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | • Afscherming bij toenadering met belemmering van het onderzoek of verzorging | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | • Afscherming in rust, ook wanneer er geen toenadering plaats vindt | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 Gelaatsuitdrukking | • Normale gelaatsuitdrukking | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • Pijnlijke gelaatsuitdrukking bij toenadering | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | • Pijnlijke gelaatsuitdrukking ook zonder toenadering | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | • Voortdurend ongebruikelijke uitdrukingsloze gelaatsuitdrukking (stil, verstart, lege blik) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 Slaappatroon | • Normaal slaappatroon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • Problemen met inslapen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | • Vaak wakker worden (onrust) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | • Slapeloosheid met als gevolg slaperigheid overdag | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PSYCHOMOTORISCHE REACTIES | | | | | |
| 6 Verzorgen en aankleden | • Geen verandering in gebruikelijke mogelijkheden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • Gebruikelijke mogelijkheden zijn beperkt (verzorgen en/of aankleden is moeilijk maar wel volledig mogelijk) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | • Gebruikelijke mogelijkheden zijn zeer beperkt, verzorgen en/of aankleden is moeilijk en maar gedeeltelijk mogelijk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | • Verzorgen en/of aankleden is onmogelijk, de patiënt verzet zich bij elke poging | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 Bewegingen | • Geen verandering in gebruikelijke mogelijkheden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • Gebruikelijke actieve mogelijkheden zijn beperkt (patiënt vermijdt bepaalde bewegingen en vermindert loopafstanden) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | • Gebruikelijke actieve en passieve mogelijkheden zijn beperkt (zelfs met hulp vermindert de patiënt zijn bewegingen) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | • Iedere beweging onmogelijk, verzet zich tegen elke poging tot mobilisatie | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PSYCHOSOCIALE REACTIES | | | | | |
| 8 Communicatie | • Onveranderd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • Toegenomen (de patiënt trekt de aandacht op een ongebruikelijke manier) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | • Verminderd (de patiënt isoleert zich, zondert zich af) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | • Afwezigheid van of weigering van elke vorm van communicatie | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 Sociale activiteiten | • Gebruikelijke deelname aan verschillende activiteiten (maaltijden, ontspanning, therapeutische activiteiten, etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • Deelname aan verschillende activiteiten alleen als men erom vraagt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | • Gedeeltelijke weigering om aan verschillende activiteiten deel te nemen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | • Alle sociale contacten worden geweigerd | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 Gedragsproblemen | • Normaal gedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • Herhaalde gedragsproblemen bij toenadering | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | • Permanente gedragsproblemen bij toenadering | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | • Permanente gedragsproblemen (zonder aanleiding/ externe stimulus) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | SCORE | | | |